

*Aves*  
do  
**PARQUE DA CULTURA**  
(BIRDWATCHING)



Em meio à exuberância da natureza, onde o verde se mescla com o céu, há um refúgio encantador para os amantes das aves: o **Parque da Cultura em Votuporanga**.

Desde 2016, este espaço abençoado tem sido o cenário de uma jornada de descoberta e encantamento para os entusiastas da observação de aves, popularmente conhecida como *birdwatching*.

Ao adentrar nos caminhos do parque, os olhos se aguçam em busca do movimento gracioso das asas, dos cantos melódiosos que ecoam pela paisagem. Aqui, a arte de observar se torna uma experiência única, onde cada ave é uma história viva a ser contada.

Desde o início deste projeto de catalogação, mais de 37 espécies de aves têm sido identificadas, cada uma com suas próprias características fascinantes. Dos majestosos Biguás, pássaros locais, aos migratórios como os Curicacas, que fazem desta terra seu lar temporário, o Parque da Cultura é um verdadeiro santuário para a biodiversidade alada.

Cada ave, meticulosamente registrada, revela um mundo de informações preciosas. Sua alimentação, os padrões de reprodução, sua classificação científica e até mesmo sua distribuição geográfica são cuidadosamente documentados. Mas a experiência vai além da simples observação. Com a tecnologia ao nosso alcance, um simples escaneamento de QR code permite aos observadores mergulharem ainda mais fundo nesse universo alado, reproduzindo os cantos e vocalizações das aves, como se pudessem conversar com elas.

O Parque da Cultura em Votuporanga foi inaugurado em 13 de Agosto de 2016, possuindo mais de 105 mil m<sup>2</sup>. Conta com dois lagos, onde é possível desfrutar de atividades como pedalinhas e tirolesa, e abriga o Centro de Informações Culturais e Turísticas, que oferece biblioteca, museu, sala de cinema, espaço para exposições, auditório aberto, sala de oficinas e a sede da Secretaria da Cultura e Turismo. Tornou-se não apenas um local de lazer e contemplação, mas também um verdadeiro centro de estudo e preservação da avifauna local. Cada visita é uma oportunidade de aprender, conectar-se com a natureza de forma íntima e contribuir para a conservação das aves do Parque da Cultura. Portanto, se você é um apaixonado pela natureza e busca a tranquilidade e o encantamento que só a observação de aves pode proporcionar, venha explorar o Parque da Cultura em Votuporanga.

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**

PREFEITO MUNICIPAL: JORGE AUGUSTO SEBA

VICE-PREFEITO: VALTER BENEDITO PEREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECULT

SECRETÁRIA DA CULTURA E TURISMO: JANAINA CRISTINA DA SILVA

DEPARTAMENTO DE TURISMO E TURISMÓLOGO RESPONSÁVEL: ALEXANDRE MIOTTO  
DA COSTA

SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS: JOÃO HÉLIO DA SILVA  
GUARIZO

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR (BIÊNIO 2022-2024)

PRESIDENTE: ORMÉLIO CAPORALINI FILHO

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA - SAEV  
AMBIENTAL: MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS

## **CRÉDITOS**

**Fotógrafo Principal:** Equipe da Secretaria da Cultura e Turismo

**Câmera:** Nikon D7100

**Local de Observação:** Parque da Cultura  
Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112

**Período:** 2017-2024

# SUMÁRIO

■ Andorinha do Rio.....	Página 05
■ Anu-Branco.....	Página 06
■ Anu-Preto.....	Página 07
■ Arara-canindé.....	Página 08
■ Avoante.....	Página 09
■ Beija-flor-tesoura.....	Página 10
■ Bem-te-vi.....	Página 11
■ Bem-te-vi-rajado.....	Página 12
■ Biguá.....	Página 13
■ Cabeça-seca.....	Página 14
■ Canário-da-terra.....	Página 15
■ Carão.....	Página 16
■ Carcará.....	Página 17
■ Carrapateiro.....	Página 18
■ Choca-barrada.....	Página 19
■ Chupim.....	Página 20
■ Coruja-buraqueira.....	Página 21
■ Curicaca.....	Página 22
■ Curutié.....	Página 23
■ Encontro.....	Página 24
■ Fim-fim.....	Página 25
■ Ganso doméstico.....	Página 26
■ Garça-branca-grande.....	Página 27
■ Garça-moura.....	Página 28
■ Gavião-carijó.....	Página 29
■ Jaçanã.....	Página 30
■ João-de-barro.....	Página 31
■ Lavadeira-mascarada.....	Página 32
■ Maria-faceira.....	Página 33
■ Martim-pescador-pequeno.....	Página 34
■ Príncipe.....	Página 35
■ Pardal.....	Página 36
■ Pato-do-mato.....	Página 37
■ Periquito-de-encontro-amarelo.....	Página 38
■ Periquito-rei.....	Página 39
■ Pica-pau-branco.....	Página 40
■ Pica-pau-do-campo.....	Página 41
■ Pica-pau-de-topete-vermelho.....	Página 42
■ Quero-quero.....	Página 43
■ Sabiá-do-campo.....	Página 44
■ Sanã-castanha.....	Página 45

■ Sanhaço-cinzento.....	Página 46
■ Socó-boi.....	Página 47
■ Socó-dorminhoco.....	Página 48
■ Socozinho.....	Página 49
■ Suiriri-cavaleiro.....	Página 50
■ Urubu-preto.....	Página 51

**CONFIRA OUTRAS ESPÉCIES DE AVES ENCONTRADAS EM  
VOTUPORANGA:**



# ANDORINHA-DO-RIO

## *Tachycineta albiventer*



### Características:

Mede entre 13 e 14 centímetros de comprimento e pesa entre 14 e 17 gramas. Como enfatiza o nome comum, muito ligada à água. A semelhança com a outra espécie do gênero torna a identificação difícil, em muitos casos.

### Alimentação:

Voa próximo à água, apanhando insetos em rápidos movimentos de ida e vinda. Pousa nas galhadas parcialmente submersas ou raízes saindo de barrancos, às vezes junto com a andorinha-de-sobre-branco (*Tachycineta leucorrhoa*) e andorinha-serradora (*Stelgidopteryx ruficollis*). São associações ocasionais, já que não se reúne a outras espécies.

### Reprodução:

Faz os ninhos no barranco do rio, às vezes em ninhos abandonados de martim-pescador. Constrói uma tigela no buraco usando capins e materiais macios.

### Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Hirundinidae 1815  
**Espécie:** *T. albiventer*



Extinta

Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:



# ANU-BRANCO

## *Guira guira*



### Características

Mede entre 36 e 42 centímetros de comprimento, incluindo seus 20 centímetros da cauda, e pesa entre 113 e 168,6 gramas. É usualmente encontrado em bandos familiares. O adulto da espécie apresenta coloração ocre-amarelada com uma crista desgrenhada.

### Alimentação:


É essencialmente carnívoro, comendo gafanhotos, percevejos, aranhas, miriápodes etc. Preda também lagartas peludas e urticantes, lagartixas, camundongos, rãs e filhotes de outras aves. Cospe pelotas. Pesca na água rasa; periodicamente come frutas, bagas, coquinhos e sementes, sobretudo na época seca.

### Reprodução:

Os seus ovos são relativamente muito grandes, tendo de 17 a 25% do peso da fêmea. A cor dos ovos é verde-marinho e uma rede branca calcária em alto relevo se espalha sobre toda a superfície. Tanto há ninhos individuais, como coletivos. A fêmea que construiu um ninho e ainda não começou a pôr os seus ovos joga fora os ovos postos ali por outras fêmeas.

### Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Cuculiformes  
**Família:** Crotophaginae  
**Espécie:** *G. guira*



Extinta


Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:



# ANU-PRETO

## *Crotophaga ani*



### Características:

Corpo franzino, mede entre 35 e 36 centímetros de comprimento e pesa entre 76 e 222 gramas de peso (Payne & Kirwan in HBW, 2016), sendo que as fêmeas da espécie apresentam peso menor que os machos. Sua coloração é preto uniforme, possui um bico alto, forte e curto que apresenta cúlmen na mesma coloração do bico. Cauda longa e graduada.

### Alimentação:

É essencialmente carnívoro, comendo gafanhotos, percevejos, aranhas, miriápodes etc. Preda também lagartas peludas e urticantes, lagartixas e camundongos. Pesca na água rasa, e periodicamente come frutas, bagas, coquinhos e sementes, sobretudo na época seca, quando há escassez de artrópodes. Presenciei em Bariri-SP, em época de seca, um bando com 7 indivíduos se alimentando de amoras (observação pessoal, João de Almeida Prado).

### Reprodução:

Faz os ninhos no barranco do rio, às vezes em ninhos abandonados de martim-pescador. Constrói uma tigela no buraco usando capins e materiais macios.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Cuculiformes  
**Família:** Cuculidae 1820  
**Espécie:** *C. ani*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# ARARA-CANINDÉ

*Ara ararauna*



## Características:

Mede cerca de 80 centímetros de comprimento. Grande e de cauda longa. Inconfundível e vistosa coloração azul ultramarino no dorso, e amarelo-dourado na parte inferior desde a face, ventre até o rabo, garganta com linha negra e área nua na cabeça com linha de penas negras. Os jovens têm as asas e o rabo café-acinzentado e os olhos pardos.

## Alimentação:


Migra em certas épocas do ano, em busca de alimento. Desloca-se a grandes distâncias durante o dia, entre os locais de descanso e de alimentação. Alimenta-se basicamente de sementes, frutas e nozes.

## Reprodução:

Nidificam entre dezembro e maio em buracos no tronco de grandes palmeiras mortas, entre 10 e 25 metros de altura, pondo 2 ovos, que são incubados por 24-26 dias.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Psittaciformes  
**Família:** Psittacidae  
**Espécie:** *A. ararauna*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# AVOANTE

## *Zenaida auriculata*



### Características:

Essa pomba tem dorso pardo, faixas negras laterais na cabeça e listras negras atrás dos olhos. Mede até 25 cm e voa rapidamente em zigue-zague. O macho exibe uma cabeça azulada e pescoço com manchas cor-de-rosa e azuis durante o acasalamento, enquanto a fêmea é amarronzada com pescoço amarelado ou esverdeado. Fora da época reprodutiva, as penas de ambos os sexos são semelhantes, sem dimorfismo sexual

### Alimentação:

Alimenta-se de grãos silvestres e de brotos de plantações. Os grandes bandos desta ave podem se transformar em pragas agrícolas em culturas de grãos. Geralmente são atraídas por restos de alimentos, farelos de milho e pães.

### Reprodução:

Essa ave é muito prolífica, construindo seus ninhos no chão, em arbustos, palmeiras ou telhados. O ninho é frágil, feito de gravetos, permitindo que ovos ou filhotes às vezes caiam com o vento ou chuva. Geralmente cria 2 ou 3 filhotes por ninhada, que são alimentados por ambos os pais e deixam o ninho em cerca de duas semanas. Ela também pode usar ninhos de asa-branca feitos em muros.

### Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Columbiformes  
**Família:** Columbidae  
**Espécie:** *Z. auriculata*



Extinta


Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:



# BEIJA-FLOR-TESOURA

## *Eupetomena macroura*



### Características:

Mede entre 15 e 18 centímetros de comprimento, sendo um dos maiores beija-flores brasileiros, pesando em torno de 6-11 gramas. Cabeça, pescoço e parte superior do tórax de um profundo azul violeta; restante da plumagem verde-escuro iridescente. Esporadicamente apresenta as penas azuladas da fronte tingidas de branco, amarelo ou de cores diversas, em virtude do acúmulo de pólen proveniente das flores que poliniza.

### Alimentação:

Alimenta-se basicamente de néctar de flores, mas também caça pequenos insetos com grande habilidade em voos curtos. É um dos visitantes mais comuns de bebedouros de água com açúcar, em cidades ou em sítios.

### Reprodução:

Na época do acasalamento, o macho faz a corte pairando em pleno voo em frente da fêmea empoleirada. Depois, macho e fêmea realizam voos de ziguezague, ocorrendo voos rasantes do macho sobre a fêmea. O ninho, em forma de tigela, é assentado em um ramo mais ou menos horizontal ou numa forquilha de arbusto ou árvore, a cerca de 2 a 3 metros do solo. Somente a fêmea incuba os ovos e os filhotes nascem após 15 a 16 dias e, enquanto o macho defende seu território e as flores com que se alimenta.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Apodiformes  
**Família:** Trochilidae Vigors, 1815  
**Espécie:** E. macroura



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# BEM-TE-VI

## *Pitangus sulphuratus*



### Características:

Ave de médio porte, o bem-te-vi mede entre 20,5 e 25 centímetros de comprimento e pesa aproximadamente de 52-68 g. Tem o dorso pardo e a barriga de um amarelo vivo; uma listra (sobrancelha) branca no alto da cabeça, acima dos olhos; cauda preta. O bico é preto, achatado, longo, resistente e um pouco encurvado.

### Alimentação:


Possui uma variada alimentação. É insetívoro, podendo devorar centenas de insetos diariamente. Mas também come frutas (como bananas, mamões, maçãs, laranjas, pitangas e muitas outras), ovos e até mesmo filhotes de outros pássaros, flores de jardins, minhocas, pequenas cobras, lagartos, crustáceos, além de peixes e girinos de rios e lagos de pouca profundidade e inclusive pequenos roedores.

### Reprodução:

Faz ninho grande e esférico, com capim e pequenas ramas de vegetais em galhos de árvores geralmente bem cerradas, com entrada lateral; porém, já foram encontrados ninhos em formato de xícara aberta. Pode utilizar para construir o seu ninho, sobretudo em zonas urbanas, material de origem humana, como papel, plástico e fios. Põe de 2 a 4 ovos de cor creme com poucas marcas marrom-avermelhadas.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Tyrannidae 1825  
**Espécie:** *P. sulphuratus*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# BEM-TE-VI-RAJADO

## *Myiodynastes maculatus*



### Características:

A maior das espécies rajadas da família, destaca-se pelo enorme bico e cabeça desproporcional ao corpo. É do tamanho do bem-te-vi. As listras superciliares brancas não se unem na nuca, como nas outras espécies de plumagem rajada.

### Alimentação:

Alimenta-se de insetos que apanha em voo a partir do poleiro e também de pequenos frutos como o da canela-amarela, sendo um provável dispersor de sementes. Gosta muito também das bananas maduras da embaúba. Aprecia os frutos/sementes da aroeira-do-campo (*Schinus lentiscifolius*). Adora cigarras e, para comê-las, faz os seguintes passos: primeiro ele as apanha em pleno voo, em seguida bate a cigarra repetidas vezes em um galho até suas asas caírem, depois joga o corpo da cigarra para cima e a engole.

### Reprodução:

Migratório no Pantanal, chega no final de julho/agosto para iniciar logo a reprodução. Ninho em ocos de árvore, geralmente feito por pica-paus. Também usa ninho com entradas laterais (de surucú e outras aves) nos cupinzeiros arborícolas.

### Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Tyrannidae 1825  
**Espécie:** *M. maculatus*



Extinta


Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:



# BIGUÁ

## *Nannopterum brasilianum*



### Características:

Mede entre 58 e 73 centímetros de comprimento e pesa entre 1,2 a 1,4 kg, com envergadura entre 100 e 102 centímetros. Sua plumagem é totalmente preta com saco gular amarelo. Possui pescoço longo, cabeça pequena, bico cinzento amarelado longo e fino, sendo que a ponta da maxila termina em forma de gancho.

### Alimentação:


Alimenta-se de peixes e crustáceos. Para capturar sua presa, mergulha a partir da superfície da água e, submerso, persegue-a. Os pés e o bico possuem função primordial na perseguição e captura. Um exímio orgulhador, não se contenta com os peixes da superfície. Mergulha mar abaixo e em meio a ziguezagues e viravoltas, conseguindo capturar sua presa. Come também girinos, sapos, rãs e insetos aquáticos.

### Reprodução:

É monogâmico. Na época do acasalamento, o ritual de corte envolve uma ampla gama de movimentos e sons, com as aves agitando as asas e movimentando o pescoço de maneira peculiar. Os membros do casal roncam como um porco, empoleirados lado a lado, e executam curiosos meneios laterais com a cabeça, por repetidas vezes, copulando a seguir. Nidifica em colônias sobre árvores em matas alagadas, sarandizais, etc.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Suliformes  
**Família:** Phalacrocoracidae 1849  
**Espécie:** N. brasilianum



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# CABEÇA-SECA

## *Mycteria americana*



### Características:

Mede entre 86 e 100 cm de comprimento e pesa em torno de 2,8 kg. Quando sobrevoa muito alto uma área, pode ser confundido com o maguari (*Ciconia maguari*). Diferentemente dos adultos, os juvenis possuem a cabeça e o pescoço emplumados e o bico mais claro

### Alimentação:

A alimentação-se coletivamente, com vários indivíduos se deslocando lado a lado na água rasa, movimentando o fundo lodoso com um dos pés para deslocar as presas, como peixes, anfíbios, pequenos répteis e invertebrados

### Reprodução:

Constrói ninhais em capões de mata alagada. Põe de 3 a 5 ovos.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Ciconiiformes  
**Família:** Ciconiidae 1836  
**Espécie:** *M. americana*



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# CANÁRIO-DA-TERRA

## *Sicalis flaveola*



### Características:

Tamanho aproximado: 13,5 centímetros. Peso médio: 20 gramas. Cor amarelo-olivácea com estrias enegrecidas nas costas e próximo das pernas. Asas e cauda cinza-oliva. A íris é negra e o bico tem a parte superior cor de chifre e a inferior é amarelada. As pernas são rosadas.

### Alimentação:

Alimenta-se de sementes no chão. É uma espécie predominantemente granívora (come sementes). O formatado bico é eficiente em esmagar e seccionar as sementes, sendo, portanto, considerada predadora e não dispersora de sementes. Ocasionalmente alimenta-se de insetos. Costuma frequentar comedouros com sementes e quirera de milho.

### Reprodução:

Faz ninhos cobertos, na forma de uma cestinha, em lugares que variam desde uma caveira de boi até bambus perfurados. Frequentemente utiliza ninhos abandonados de outros pássaros, sobretudo do João-de-Barro. Pode fazer ninhos em forma de cesta em plantas epífitas (orquídeas e bromélias), em buracos de telhas e outros locais que ofereçam proteção. A fêmea põe em média 4 ovos, que são chocados por 14 ou 15 dias.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Thraupidae 1847  
**Espécie:** *S. flaveola*



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# CARÃO

## *Aramus guarauna*



### Características:

O carão mede até 70 cm de comprimento, possuindo o corpo pardo-escuro com garganta branca, bico com mandíbula amarela, cabeça e pescoço estriados de branco e pernas negras. Espécie sem dimorfismo sexual.

### Alimentação:

Alimenta-se de grandes caramujos aquáticos chamados aruás (furando-os com o bico), podendo comer ainda caramujos terrestres e pequenos lagartos. Captura os aruás na vegetação densa ou mesmo no fundo de lagos rasos, sem mergulhar, entrando na água somente até a altura da barriga.

### Reprodução:

Faz ninho grande, como um cesto profundo, depositado sobre a vegetação alta dentro de brejos. Põe de 3 a 6 ovos de cor creme com manchas marrons.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Gruiformes  
**Família:** Aramidae 1852  
**Espécie:** *A. guarauna*



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# CARCARÁ

## *Caracara plancus*



### Características:

Medindo cerca de 50-60 centímetros da cabeça a cauda, o peso do macho é de 834 g; a fêmea pesa 953 g e mede cerca de 123 centímetros de envergadura; o carcará é facilmente reconhecível quando pousado, pelo fato de possuir uma espécie de solidéu preto sobre a cabeça, assim como um bico adunco e alto, que assemelha-se à lâmina de um cutelo; a face é vermelha.

### Alimentação:

Não é um predador especializado, e sim um generalista e oportunista, assim como o seu parente próximo, o carrapateiro (*Milvago chimachima*). Onívoro, alimenta-se de quase tudo o que acha, de animais vivos ou mortos até o lixo produzido pelos humanos, tanto nas áreas rurais quanto urbanas.

### Reprodução:

Constrói um ninho com galhos em bainhas de folhas de palmeiras ou em outras árvores. Usa ninho de outras aves também. A postura do carcará é composta de dois ou três ovos, sendo raro encontrar um quarto ovo.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Falconiformes  
**Família:** Falconidae 1820  
**Espécie:** *C. plancus*



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# CARRAPATEIRO

## *Milvago chimachima*



### Características:

Mede entre 36 e 45 centímetros de comprimento, o peso do macho varia entre 277 e 335 gramas e o da fêmea varia entre 307 e 364 gramas. Sua envergadura atinge 74 centímetros. Cabeça e corpo branco-amarelado, dorso marrom-escuro, lista pós ocular preta, asas longas com mancha branca perceptível quando em voo. A cauda é longa com larga banda terminal marrom escura.

### Alimentação:


Alimenta-se principalmente dos parasitas de bovinos e equinos tais como carrapatos. Quando não encontra carrapatos, seu prato principal, alimenta-se de lagartas e cupins, saqueia ninhos, alimenta-se de carniça, frutas e outras opções. Em remanescentes florestais preda parasitas de herbívoros de grande porte, como a anta e os veados.

### Reprodução:

Constrói grandes ninhos, de ramos secos, em palmeiras ou em outras árvores. Os ovos, de 5 a 7, são redondos, pardo-amarelos com manchas pardo-vermelhas. A fêmea encarrega-se da incubação e o macho fornece-lhe o alimento durante tal período. A incubação dos ovos dura de 21 a 23 dias. Após o nascimento dos filhotes o macho continua a alimentar a fêmea e esta, por sua vez, os jovens.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Falconiformes  
**Família:** Falconidae 1820  
**Espécie:** *M. chimachima*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# CHOCA-BARRADA

## *Thamnophilus doliatus*



### Características:

Domina no macho a coloração negra, enquanto a fêmea é amarronzada. Entretanto, o macho é todo barrado (razão de um dos nomes comuns), exceto pelo negro uniforme do alto da cabeça, enquanto a fêmea possui somente os lados da cabeça estriados. Na ave adulta, o olho é branco com leve tom amarelado (marrom avermelhado nos juvenis). Também mantém as penas da cabeça eriçadas boa parte do tempo, em um topete muito destacado. Apresenta um comprimento de 16 centímetros..

### Alimentação:

Percorre a parte central e alta dos arbustos, caçando invertebrados e mantendo contato com piados graves..

### Reprodução:

Em seu comportamento reprodutivo, constrói seus ninhos nas bordas da mata e nos arbustos.

O ninho em forma de taça costuma ser construído em arbustos fechados. Os ovos, geralmente dois, são incubados pelo casal por cerca de duas semanas. O casal se reveza na alimentação dos filhotes, que levam mais duas semanas para abandonar o ninho. Há relatos de casais que procriaram duas vezes na mesma estação reprodutiva.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Thamnophilidae  
**Espécie:** *T. doliatus*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# CHUPIM

## *Molothrus bonariensis*



### Características:

Mede cerca entre 17 e 21,5 centímetros de comprimento e pesa entre 44,9 e 63,7 gramas. O macho adulto é preto-azulado, mas dependendo da iluminação só se enxerga a cor negra. A fêmea é marrom-escura. Pode ser confundido com a passaro-preto (*Gnorimopsar chopi*), mas este é maior e possui o bico mais alongado, fino e com sulco na maxila inferior.

### Alimentação:

Possui uma dieta onívora, alimentando-se principalmente de insetos e sementes, mas ocasionalmente come frutos e flores. Costuma frequentar comedouros com sementes e quirera de milho. Também pode se alimentar de carrapatos em capivaras (*Hydrochoerus hydrochaeris*).

### Reprodução:

O período entre julho e dezembro marca o início da reprodução, mas é após o acasalamento que se inicia a fase pela qual a espécie é mais conhecida. Esta espécie não constrói ninho e a fêmea põe 4 ou 5 ovos por postura, sendo um no ninho de cada hospedeiro.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Icteridae 1825  
**Espécie:** *M. bonariensis*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# CORUJA-BURAQUEIRA

## *Athene cunicularia*



### Características:

Ave de pequeno porte, seu tamanho médio é de 21,5 a 28,5 cm (machos) e de 22 a 25 cm (fêmeas). Pesa entre 110 e 285 g (machos) e entre 150 a 265 g (fêmeas). Possui a cabeça redonda, sem penachos e os olhos estão dispostos lado a lado, num mesmo plano. As sobrancelhas são brancas e os olhos amarelos. A coloração é cor de terra, mimética, podendo apresentar plumagem em tons de ferrugem causados por solos de terra roxa (coloração adventícia).

### Alimentação:


É uma predadora de pequeno porte com hábito carnívoro-insetívoro, sendo considerada generalista por consumir as presas mais abundantes de acordo com a estação, tendo preferência por roedores. As ordens de insetos consumidas são: coleópteros (besouros), ortóptera (grilos e gafanhotos), díptera e himenóptera. Os vertebrados consumidos são representados pelos: roentia, marsupialia, amphibia, répteis squamata, microquiroptero (morcegos verdadeiros).

### Reprodução:

A reprodução da coruja-buraqueira começa entre março ou abril. Faz seus ninhos em cupinzeiros, buracos de tatu e buracos na areia em regiões litorâneas, costumando cavar túneis de até 2 metros e forrar o fundo com capim seco.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Strigiformes  
**Família:** Strigidae 1820  
**Espécie:** *A. cunicularia*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# CURICACA

## *Theristicus caudatus*



### Características:

O macho costuma ser um pouco maior que a fêmea, atingindo 69 centímetros de comprimento e cerca de 143 centímetros de envergadura. Distinguível pela coloração clara, asas largas e bico longo e curvo. Apresenta o dorso cinzento-claro, com brilho esverdeado, rêmiges e retrizes pretas; parte das coberteiras superiores das asas é esbranquiçada, formando uma mancha clara no lado superior da asa, visível durante o voo.

### Alimentação:

Alimenta-se durante o dia e também ao pôr do sol. Tem alimentação variada, composta por artrópodes, como centopeias, aranhas, insetos adultos e larvas, entre outros invertebrados, podendo pregar ainda pequenos lagartos, ratos, caramujos, anfíbios e pequenas serpentes, e até mesmo aves menores. Seu bico, longo e curvo, é adaptado para extrair larvas de besouros e outros insetos da terra fofa.

### Reprodução:

Costuma pôr de dois a quatro ovos, em ninhos de gravetos nas árvores ou mesmo grandes rochas nos campos. Os ninhos formam colônias numerosas durante o período de reprodução. Habita campos secos, alagados e pastagens.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Pelecaniformes  
**Família:** Threskiornithidae 1904  
**Espécie:** *T. caudatus*



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# CURUTIÉ

## *Certhiaxis cinnamomeus*



### Características:

Geralmente o furnarídeo paludícola mais frequente. Tem o aspecto de um joão-teneném de cauda longa bem rígida. As partes superiores pardo ferrugíneas, partes inferiores esbranquiçadas. Mento com uma manchinha amarelo-sulfúrea que pouco se destaca à distância e não aparente nos indivíduos jovens. Mede cerca de 14 centímetros de comprimento. Duro “krip”; estrofe monótona, dura e descendente terminalmente, lembrando a voz da sanã-parda (*Laterallus melanophaius*), mas de menor volume (canto); o casal canta em dueto.

### Alimentação:

Sua alimentação consiste de insetos e suas larvas, aranhas, opiliões e outros artrópodes e moluscos.

### Reprodução:

Constrói seu ninho com gravetos, em pequenas moitas próximo a ambientes aquáticos. O ninho é preso em forquilhas e galhos laterais, com a forma de uma garrafa deitada com o bojo redondo. Procria praticamente todos os meses do ano, botando 3 ovos creme-claros. Os filhotes nascem após 14 a 15 dias de incubação, e com cerca de 18 dias abandonam o ninho.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Furnariidae  
**Espécie:** *C. cinnamomeus*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# ENCONTRO

## *Icterus pyrrhopterus*



### Características:

Mede cerca de 20 centímetros de comprimento. O macho da espécie tem 33,3 gramas de peso médio e a fêmea 30,4 gramas de peso médio. O corpo longilíneo, terminado por uma longa cauda, produz uma silhueta característica, ainda mais sublinhada pelo bico fino. Sobre as asas, no encontro (razão de um dos nomes comuns) apresenta uma área de penas diferenciadas de coloração que vai do amarelo ao castanho forte. Nos machos existe uma sutil diferença das fêmeas; a curva da asa(ombro) é amarela nos machos e preta nas fêmeas.

### Alimentação:

Sempre metido no meio da vegetação da copa ou das bordas, procura invertebrados, frutos e flores. Como o João-pinto, suga o néctar das flores, abrindo-as ou enfiando o bico. Gosta das flores de ipê, tarumã, piúva e pombeiro, umbigo de bananeira, entre outras.

### Reprodução:

Cada casal constrói seu ninho em forma de bolsa, distante dos demais. Possui um canto flautado, mas costuma imitar várias outras aves em suas longas estrofes improvisadas. Entremeia o canto das outras aves com um chamado curto e grave, próprio. Tem normalmente 1 ninhada por estação com 3 ovos.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Icteridae 1825  
**Espécie:** *I. pyrrhopterus*



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# FIM-FIM

## Euphonia chlorotica



### Características:

Essa ave mede 9,5 cm e pesa cerca de 8 g. O macho é colorido e tem um canto assobiado característico, com sons como “di-di” e “fi-fi”. Seu canto é fraco e rápido, lembrando o de um pintassilgo, e pode imitar outras aves. A fêmea é verde-olivácea, com fronte amarelada e ventre esbranquiçado, e também possui um canto elaborado.

### Alimentação:

Essa ave frugívora pousa ao lado de frutos e os consome um a um. As sementes ingeridas passam intactas pelo sistema digestivo e são dispersas pelas fezes, ajudando na germinação. Apreciam frutos de ervas-de-passarinho e são excelentes dispersoras de sementes. Não possuem moela, e o papo é atrofiado, refletindo sua dieta exclusivamente frugívora..

### Reprodução:

Atinge a maturidade sexual com cerca de 12 meses. Cada ninhada geralmente tem entre 2 e 5 ovos, tendo de 2 a 3 ninhadas por temporada. Os filhotes nascem após 15 dias. No período reprodutivo o macho costuma ficar cantando nas horas mais quentes do dia, pousado sob a copa. Nessas cantorias, usa um canto próprio, elaborado, às vezes mesclado com imitações.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Fringillidae  
**Espécie:** E. chlorotica



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# GANSO-DOMÉSTICO

## Anser domesticus



### Características:

São animais domésticos que variam em tamanho e coloração dependendo da raça. Podem ter a plumagem toda branca ou ainda com variações de cinza e bege. São maiores que as espécies selvagens do qual o ganso doméstico se originou.

### Alimentação:

Os gansos são aves herbívoras, com tendências omnívoras, alimentando-se geralmente de capim, legumes, frutas, grãos, ervas, caracóis, insetos e minhocas.

### Reprodução:

Para a maioria das raças de ganso, o período de acasalamento já ocorre aos 8 ou 9 meses de vida, entre os meses de julho e dezembro. Entretanto, para o melhoramento genético, os criadores devem selecionar os melhores exemplares na proporção de 1 macho para 2 fêmeas, ou 1 macho para 3 fêmeas.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Anseriformes  
**Família:** Anatidae 1820  
**Espécie:** A. domesticus



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# GARÇA-BRANCA-GRANDE

## Ardea alba



### Características:

Mede entre 65 e 104 centímetros de comprimento e pesa entre 700 e 1700 g (Martínez-Vilalta, Motis, e Kirwan, 2016). É uma das mais elegantes garças brancas. De plumagem inteiramente branca, o que, juntamente com o seu grande tamanho, suas longas pernas e pescoço, a torna uma ave inconfundível.

### Alimentação:

Alimenta-se principalmente de peixes, mas já foi vista comendo quase tudo o que possa caber em seu bico. Pode consumir pequenos roedores, anfíbios, répteis como lagartos Ameiva ameiva (Pommer-Barbosa et al., 2021), insetos, pequenas aves e até lixo. Em pesqueiros aproxima-se muito dos pescadores para pegar pequenos peixes por eles dispensados, chegando a comer na mão

### Reprodução:

Sendo uma ave cosmopolita, a época da reprodução depende da subespécie e de sua distribuição. Na época da reprodução os indivíduos de ambos os sexos apresentam longas penas no dorso chamadas egretas. Estas egretas foram por muito tempo moda como adorno de chapéus e roupas na Europa e a demanda pelas penas levou centenas de milhares de garças à morte justamente em seu período reprodutivo.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Pelecaniformes  
**Família:** Ardeidae 1820  
**Espécie:** A. alba



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# GARÇA-MOURA

## Ardea cocoi



### Características:

A maior das garças do Brasil, com envergadura de 1,80 m. Vive solitária fora do período reprodutivo, quando reúne-se nos ninhais; no entanto, mesmo nesse período, a maioria mantém-se isolada durante deslocamentos para alimentação. Seus voos, além de solitários, são em linha reta, com lentas batidas ritmadas de asas, muito características.

### Alimentação:

Costuma ficar pousada nas margens dos rios e riachos, em meio à vegetação, pescando peixes, sapos, rãs, pererecas, caranguejos, moluscos e pequenos répteis. Captura presas de lugares mais fundos, que outras garças não conseguem alcançar. Geralmente solitário e territorial, mas ocasionalmente se alimenta em grandes grupos, incluindo outras espécies, quando a quantidade de presa é abundante, principalmente na época da seca.

### Reprodução:

Longo período de nidificação (janeiro a outubro), desde o meio da estação de cheia até a baixa das águas. Ocupa os grandes ninhais coletivos. As colônias podem ter até 400 a 600 casais e ser compartilhada com outras espécies. Seus ninhos geralmente estão na parte superior e externa das árvores mais altas, com 25 a 30 metros de altura. No entanto, às vezes priorizam arbustos, áreas de junco e até cactos.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Pelecaniformes  
**Família:** Ardeidae 1820  
**Espécie:** A. cocoi



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# GAVIÃO-CARIJÓ

## Rupornis magnirostris



### Características:

Mede de 31 a 41 centímetros de comprimento, e o peso do macho varia entre 206-290 gramas e da fêmea 257-350 gramas, sendo os machos 20% menores que as fêmeas. Há grande diferença entre os adultos e os imaturos, sendo que os últimos podem ser confundidos com vários outros gaviões, pois apresentam a coloração marrom-carijó. Já os adultos apresentam a ponta do bico negra com a base amarelada; a cabeça e a parte superior das asas são amarronzadas, mas tornam-se cinza à medida que a ave amadurece.

### Alimentação:

Sua ampla distribuição geográfica também se reflete nos seus hábitos alimentares generalistas, pois consome desde insetos, como cupins *Coptotermes testaceus* (Barbosa et al., 2022), até aves, ratos e lagartos.

### Reprodução:

O gavião-carijó vive em casais que constroem um ninho de gravetos revestido por folhas com cerca de meio metro de diâmetro, geralmente no topo de uma árvore grande. As fêmeas apresentam os dois ovários desenvolvidos, em vez de apenas o esquerdo como as outras aves. A postura de em média 2 ovos é depositada sobre um revestimento de folhas secas e incubada pela fêmea.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Accipitriformes  
**Família:** Accipitridae 1824  
**Espécie:** R. magnirostris



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# JAÇANÃ

## Jacana Jacana



### Características:

Uma das aves mais comuns nos brejos e margens de rios, possui os pés enormes para seu tamanho. Além de ter os dedos longos e finos, também as unhas são muito compridas.

### Alimentação:

Nas plantas, ou logo abaixo delas, encontra os insetos, pequenos peixes e outros invertebrados de sua alimentação. Come também grãos.

### Reprodução:

Vive aos casais ou em pequenos grupos, sendo a fêmea maior do que o macho. Em alguns locais, as fêmeas montam pequenos haréns de machos, os quais tomam conta dos ninhos. Os ovos ficam em estruturas formadas por talos de plantas aquáticas, flutuantes. Durante 28 dias são chocados 4 ovos da postura, sendo papel masculino todo o trabalho de criação. Se alguma fêmea que não seja a esposa do macho aparecer, vai esmagar os ovos enquanto o macho só fica olhando, por causa de amnésia, acaba acasalando com ela no final.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Charadriiformes  
**Família:** Jacanidae 1854  
**Espécie:** J. jacana



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# JOÃO-DE-BARRO

## Furnarius rufus



### Características:

Mede 18 a 20 centímetros de comprimento e pesa 49 gramas. Possui o dorso inteiramente marrom avermelhado (por isso o epíteto específico rufus). Apresenta uma suave sobrançelha, formada por penas mais claras, em leve contraste com o restante da plumagem da cabeça.

### Alimentação:

O pássaro João-de-Barro tem o hábito de procurar seu alimento em baixo de folhas, galhos ou troncos caídos. Sua preferência é por formigas, içás, cupins, larvas, aranhas e outros artrópodes. Dificilmente se alimenta de sementes.

### Reprodução:

O casal constrói em conjunto um ninho interessante, em formato de forno de barro, o qual pode ser facilmente identificado no alto de árvores e postes em regiões campestres. No interior do ninho há uma parede que separa a entrada e a câmara incubadora, construída para diminuir as correntes de ar e o acesso de possíveis predadores. Utiliza como matéria-prima o barro úmido, esterco e palha, cujas proporções dependem do tipo de solo (se arenoso, a quantidade de esterco chega a ser maior do que a de terra).

### Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Furnariidae 1840  
**Espécie:** F. rufus



Extinta

Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:



# LAVADEIRA-MASCARADA

## Fluvicola nengeta



### Características:

Mede entre 14,5 e 16 centímetros de comprimento e pesa de 14 a 20 gramas. Sua coloração é principalmente branca contrastando com uma estreita faixa transocular preta que termina em uma leve curvatura para baixo logo após a região auricular. A testa, coroa e nuca são brancas. O manto apresenta coloração clara levemente castanho-acinzentado.

### Alimentação:

Alimenta-se de pequenos artrópodes que captura na lama das margens de rios, açudes, brejos e pocilgas, de onde raramente se afasta. Antes de se alimentar, tem um comportamento igual ao do bem-te-vi, de estar com o alimento no bico e batê-lo contra o chão.

### Reprodução:

Seu ninho é feito de gravetos que são geralmente amontoados em árvores próximas à água. É comum ver estas aves em casais. A postura normal é de três ovos brancos com manchas marrons. A incubação é de 15 dias e dá origem entre dois e três ninhegos por ninho, o que está de acordo com a literatura.

### Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Tyrannidae  
**Espécie:** F. nengeta



Extinta

Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:



# MARIA-FACEIRA

## Syrigma sibilatrix



### Características:

Mede entre 53 e 64 centímetros de comprimento e pesa entre 521 e 546 gramas de peso. Inconfundível. É a única garça brasileira com este padrão de coloração. O nome comum está ligado às cores espetaculares da cabeça.

### Alimentação:

Passa a maior parte do tempo no solo, andando à procura de insetos. Quando em regiões alagadas nunca se aventura em águas profundas, preferindo as margens alagadas, ricas em vegetação, onde se alimenta não só de insetos, mas também de anfíbios, pequenos roedores e peixes como o *Synbranchus marmoratus* (muçum) e *Gymnotus carapo* (tuvira), ambos adaptados a águas barrentas.

### Reprodução:

Na época da reprodução, o macho tem um voo de exibição, que exibe na frente da fêmea, que envolve voar para frente e para trás e deslizar em círculos. A época reprodutiva é muito extensa e variável. Geralmente, é de abril a setembro no norte e setembro a janeiro no Brasil e no sul. Seu ninho é feito de gravetos e construído em árvores, geralmente em um grande galho horizontal, entre 3 e 8 metros acima do solo. A construção é tão solta e frágil que muitas vezes os ovos podem ser vistos através do fundo, que não é forrado.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Pelecaniformes  
**Família:** Ardeidae 1820  
**Espécie:** *S. sibilatrix*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# MARTIM-PESCADOR-PEQUENO

## Chloroceryle americana



### Características:

Mede 19 centímetros de comprimento. Partes superiores em verde bem escuro, contrastando com uma faixa branca saliente e sedosa que liga a base do bico à nuca, onde é atravessada pelo penacho nugal; asas atravessadas por 3 linhas transversais de manchas brancas; bases das retrizes externas brancas. O macho tem as partes inferiores brancas com o peito castanho e a fêmea tem peito amarelado ou brancomanchado de verde.

### Alimentação:

Para alimentar-se, pousa na vegetação à beira d'água (entre 1 e 3 metros de altura), de onde observa suas presas antes de mergulhar. Às vezes paira no ar antes de mergulhar. Come peixes de 3 a 5,5 centímetros e crustáceos, sendo uma espécie de hábitos alimentares mais generalista.

### Reprodução:

O casal constrói o ninho geralmente num barranco de rio, acima do nível da água. Escava um túnel com cerca de 80 cm, podendo ou não camuflar a entrada do mesmo. Põe geralmente 3 a 5 ovos brancos, que medem em torno de 24 por 19 milímetros, no fundo do túnel. A incubação noturna cabe à fêmea, mas durante o dia ela se reveza com o macho. Como é regra na família, o período de incubação é de 19 a 21 dias e os pais cuidam dos filhotes.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Coraciiformes  
**Família:** Alcedinidae  
**Espécie:** C. americana




Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# PRÍNCIPE P. rubinus



## Características:

Mede entre 13 e 14 centímetros de comprimento e pesa entre 11 e 14 gramas. O macho, em plumagem de reprodução, é inconfundível. O vermelho vivo da parte ventral contrasta com o dorso escuro. Atrás dos olhos, uma linha escura reforça o contraste e torna-o único. Na fêmea e no macho juvenil, bem como no macho adulto entre março e julho, a plumagem da região ventral é cinza clara com estrias mais escuras.

## Alimentação:

Alimenta-se de insetos capturados no ar ou no solo, daí retornando ao poleiro favorito.

## Reprodução:

Reproduz-se na primavera ao retornar da migração. O ninho tem forma de tigela chata e é revestido por raízes e musgos, e no interior contém painas e lãs. Coloca de 4 a 5 ovos. No período reprodutivo, o macho adquire coloração vermelha da plumagem, e após a reprodução ele adquire penas marrons, características do descanso sexual. No período reprodutivo, o macho voa adquirindo aspecto de uma borboleta e nessa ocasião canta bastante.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Pelecaniformes  
**Família:** Ardeidae 1820  
**Espécie:** P. rubinus



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# PARDAL

## Passer domesticus



### Características:

Mede entre 13 e 18 centímetros de comprimento, sendo que sua envergadura está entre 19 a 25 centímetros, e o peso varia entre 10 e 40 gramas. Esta espécie apresenta dimorfismo sexual. Os machos apresentam duas plumagens: (1) durante a primavera, apresentam cor acinzentada na região do píleo e na fronte; cor preta no oró e na garganta; cor marrom com riscos pretos nas asas e região dorsal; cor cinza-claro ou branca no rosto, peito e abdômen.

### Alimentação:

Sua alimentação consiste de sementes, flores, insetos, brotos de árvores e restos de alimentos deixados pelos seres humanos. Costuma frequentar comedouros com sementes e quirera de milho. Alimenta-se também de frutos como banana, maçã e mamão.

### Reprodução:

O ninho é esférico com entrada lateral, feito de capins, penas, papel, algodões e outras fibras, excepcionalmente feito pelo macho. Ele é construído em cavidades e fendas afastadas do solo, em árvores, telhados, postes de iluminação pública e semáforos. Ninhos de outras aves também podem ser utilizados. Os 4 ovos cinzentos manchados são incubados pelo casal durante 12 dias. Os filhotes são alimentados com pequenos artrópodes e abandonam o ninho

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Passeridae  
**Espécie:** P. domesticus



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# PATO-DO-MATO

## Cairina moschata



### Características:

O macho é quase o dobro do tamanho das fêmeas e jovens. Quando passam voando juntos, é possível distinguir os sexos no ar. Apresentam comprimento aproximado de 85 centímetros, envergadura de 120 centímetros e peso no macho de 2,2 kg; por sua vez, a fêmea pesa aproximadamente a metade.

### Alimentação:

Alimentam-se de raízes, sementes e folhas de plantas aquáticas, apanhadas flutuando ou através de filtragem da lama do fundo. Nadam com a cabeça e pescoço afundados, enquanto buscam alimentação. Também apanham pequenos invertebrados nessas filtragens.

### Reprodução:

Os ninhos são feitos em ocos de árvores, às vezes palmeiras mortas cujo interior está oco. Muitos são ninhos a 5 ou 6 metros de profundidade em relação à boca, localizados próximo à água ou na margem das matas próximas. O filhote sai do ninho logo depois do nascimento, sendo chamado pela pata, do lado de fora. A ninhada segue-a, caminhando para a água mais próxima. O período reprodutivo vai de outubro a março.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Anseriformes  
**Família:** Anatidae 1820  
**Espécie:** C. moschata



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# PERIQUITO-DE-ENCONTRO-AMARELO

## Brotoyeris chiriri



### Características:

Apresenta uma faixa amarela nas coberteiras superiores das rêmiges secundárias de cada asa, isto é, na região superior das asas, e uma coloração amarelo-esverdeada em sua face. Os indivíduos adultos medem de 22,0 a 23,5 centímetros de comprimento, a cauda 10 centímetros e as asas cerca de 12,5 centímetros. Possui bico resistente e de cor branco-amarronzada, com o qual parte seu alimento. Ao redor de seus olhos escuros, existe uma delimitação branca formada apenas pela pele.

### Alimentação:

Alimenta-se de frutos, sementes, flôres, néctar e cupins. Em certas épocas do ano podem frequentar comedouros com sementes como milho por exemplo (Observação Pessoal: João de Almeida Prado). Aprecia muito os frutos da Palmeira Jerivá.

### Reprodução:

Faz o ninho em cavidades de árvores, telhas de edificações e até mesmo em ninhos escavados em cupinzeiros arborícolas e em casas de joão-de-barro abandonadas. Costuma botar cerca de 5 ovos brancos com dimensões de 23 por 19 milímetros. Após 26 dias, a fêmea conclui a incubação, nascendo os filhotes. Estes são alimentados pelos pais com sementes e frutos regurgitados mesmo após o abandono do ninho, que ocorre 8 semanas após o nascimento.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Psittaciformes  
**Família:** Psittacidae 1815  
**Espécie:** B. chiriri



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# PERIQUITO-REI

## Eupsittula aurea



### Características:

Mede cerca de 25-29 centímetros de comprimento e pesa cerca de 86 gramas. Cabeça verde com uma faixa dianteira cor de pêssego, face azulada, ventre verde-amarelado. Tem a região ao redor dos olhos laranja nos adultos e cinzenta nos juvenis.

### Alimentação:

Trepando na ramaria, utiliza o bico como um terceiro pé e usa as patas para segurar a comida, levando-a à boca. Normalmente, aprecia as sementes e não a polpa das frutas, porém gosta de comer polpa de caju. Também se alimenta da amendoa da castanha dos maturis que é quando o caju ainda está verde. Procura por mangueiras, jabuticabeiras, goiabeiras, laranjeiras e mamoeiros.

### Reprodução:

O período reprodutivo ocorre de setembro a dezembro. Para nidificar utiliza troncos ocos de palmeiras ou de outras árvores, porém é comum reproduzir em buracos de rochas erodidas, ou até mesmo em barrancos ou cupinzeiros. Esses cupinzeiros geralmente têm forma circular e são encontrados em árvores do cerrado, entre 1,5 e 5,0 metros de altura. Cava um túnel vertical na parte inferior do cupinzeiro e abre uma câmara de postura em seu terço superior.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Psittaciformes  
**Família:** Psittacidae 1815  
**Espécie:** E. aurea



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# PICA-PAU-BRANCO

## Melanerpes candidus



### Características:

Mede entre 24 a 29 centímetros e pesa entre 98 e 136 gramas. O macho adulto apresenta manto preto. Asas com as penas de voo marrom escuro. A fêmea tem a plumagem semelhante à do macho, mas ela não tem as penas amarelas na nuca. O juvenil apresenta a coloração um pouco mais marrom escuro do que preto, com a plumagem menos brilhante. As áreas brancas são tingidas de bege, e a mancha amarela na barriga é mais diluída.

### Alimentação:

Alimenta-se de insetos e suas larvas, sementes, frutos como a Jácá (*Artocarpus heterophyllus*) (Barbosa et al., 2021) e mel. Caça insetos, especialmente sob a casca. Ataca ninhos de marimbondos e vespas. Nessas ocasiões, é notável como esses insetos voam próximo ao pica-pau, sem atacá-lo com seus ferrões.

### Reprodução:

Para nidificar, escava seu ninho em troncos de árvores secas e palmeiras e, às vezes, utiliza uma cavidade natural em rochas, onde põe 3 a 4 ovos brancos e brilhantes. Os filhotes deixam o ninho com aproximadamente 35 a 36 dias. Durante a época do acasalamento realiza voos de exibição.

### Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Piciformes  
**Família:** Picidae 1820  
**Espécie:** *M. candidus*



Extinta

Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:



# PICA-PAU-DO-CAMPO

## Colaptes campestris



### Características:

Possuindo 32 centímetros de comprimento, essa espécie é facilmente identificável por conta da sua coloração; tem os lados da cabeça e do pescoço amarelos, assim como o peito; o alto da cabeça e a nuca são negros, da mesma forma que o bico e os tarsos, manto e barriga barrados e o baixo dorso é visivelmente branco ao voo.

### Alimentação:

Alimenta-se de insetos, principalmente formigas e cupins. A secreção de sua glândula mandibular é como uma cola que faz com que a língua funcione como uma vara de fisgo para capturar os insetos. Eventualmente pode-se alimentar de pequenos frutos, especialmente quando há abundância durante o período de frutificação.

### Reprodução:

Os ninhos são bastante elaborados, e em muitos casos, construídos a cada período reprodutivo. Preferem cavar a face do barranco que se inclina para o solo, o que facilita a proteção quanto à chuva e a defesa de entrada. Geralmente fazem mais de uma cavidade, sendo que a entrada corresponde ao tamanho do corpo desta espécie, não permitindo que outras aves e/ou predadores tenham acesso (SICK, 1997).

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Piciformes  
**Família:** Picidae 1820  
**Espécie:** C. campestris



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# PICA-PAU-DE-TOPETE-VERMELHO

## Campephilus melanoleucos



### Características:

Mede entre 33 e 38 centímetros de comprimento e pesa entre 181 e 284 gramas. Apresenta dimorfismo sexual. O macho tem a cabeça e topete vermelhos, base do bico com uma mancha branca e nódoa alvinegra subauricular.

### Alimentação:

Vive aos pares ou em grupos de até 5 indivíduos, arrancando a casca de grandes árvores mortas em busca de larvas de insetos. Também come frutos.

### Reprodução:

Faz seu ninho escavando troncos de árvores mortas ou palmeiras, chocando 2 a 3 ovos branco e brilhantes. Defendem seus ovos do assédio constante de aranhas.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Piciformes  
**Família:** Picidae 1820  
**Espécie:** C. melanoleucos



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# QUERO-QUERO

## *Vanellus chilensis*



### Características:

Mede 37 centímetros de comprimento e pesa cerca de 277 gramas. Possui um esporão pontudo, ósseo, com 1 centímetro de comprimento no encontro das asas, uma faixa preta desde o pescoço ao peito e ainda umas penas longas (penacho) na região posterior da cabeça; tem um desenho chamativo de preto, branco e cinzento na plumagem.

### Alimentação:

O quero-quero se alimenta de invertebrados aquáticos e peixinhos que encontra na lama. Para capturá-los, ele agita a lama com as patas para provocar a fuga de suas presas. Também se alimenta de artrópodes e moluscos terrestres.

### Reprodução:

Na primavera, a fêmea põe normalmente de três a quatro ovos. Nidifica em uma cavidade esgravatada no solo; os ovos têm formato de pão ou pera, forma adequada para rolaem ao redor de seu próprio eixo e não lateralmente, sendo manchados, confundindo-se perfeitamente com o solo. Quando os adultos são espantados do ninho, fingem-se de feridos a fim de desviar dali o inimigo; o macho torna-se agressivo até mesmo a um homem. Os filhotes são nidífugos, capazes de abandonar o ninho quase que imediatamente após o descascamento do ovo.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Charadriiformes  
**Família:** Charadriidae 1820  
**Espécie:** *V. chilensis*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# SABIÁ-DO-CAMPO

## Mimus saturninus



### Características:

Mede entre 23,5 e 26 centímetros de comprimento e pesa entre 55 e 73 gramas. Possui uma coloração cinzenta no dorso, alto da cabeça, asas e cauda. O peito e o ventre são branco-amarelados ou arroxeados pela terra. A listra superciliar branca, destacada pela faixa negra na altura dos olhos, é uma característica importante para a identificação. Os olhos dos adultos são amarelados, marrom escuros nas aves juvenis, as quais também possuem o peito rajado de cinza escuro.

### Alimentação:

São onívoros, alimentam-se principalmente de invertebrados e frutos. Dentre os invertebrados, os insetos (formigas, cupins, besouros) constituem a maior parte das presas. Os frutos podem ser silvestres (neste caso de pequeno tamanho, engolidos inteiros) ou cultivados, como laranja e abacate.

### Reprodução:

O ninho é construído grosseiramente com gravetos secos, grama e algodão, em forma de tigela rasa sobre árvores ou arbustos e em certos locais sobre os grandes ninhos abandonados de outros pássaros. O centro do ninho é forrado com material macio. Os ovos são verde-azulados com manchas cor de ferrugem. A fêmea põe de 3 a 4 ovos e, às vezes, choca ovos de outros pássaros.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Mimidae  
**Espécie:** M. saturninus



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# SANÃ-CASTANHA

## *Rufirallus viridis*



### Características:

Mede cerca de 18 cm de comprimento. Possui as partes superiores castanho escuro e as partes inferiores castanho avermelhado. Lados da cabeça em tons mais cinzas que as partes superiores. Coroa castanho avermelhado mais escura que as partes inferiores. Olhos vermelhos e pés rosados. Jovens em tons mais cinzas e sem o castanho avermelhado das partes inferiores.

### Alimentação:

Alimenta-se de insetos, formigas e sementes de capim. Também se alimenta de frutas que eventualmente caem no chão.

### Reprodução:

Faz ninho esférico de gramíneas com entrada lateral. Põe de 1 a 3 ovos.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Gruiformes  
**Família:** Rallidae  
**Espécie:** *R. viridis*



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# SANHAÇO-CINZENTO

## Thraupis sayaca



### Características:

Mede entre 16 e 19 centímetros de comprimento e pesa entre 28 e 43 gramas. (Hilty, 2011). O adulto de *Thraupis sayaca* apresenta coloração geral cinzenta, com as asas e cauda de coloração azul turquesa. Sua cabeça é cinza com uma fina e tênue faixa pós ocular cinza escuro que nem sempre está visível. Testa, coroa e nuca também cinza. Os lores são cinza, da mesma coloração da cabeça.

### Alimentação:

Frutos, costuma consumir muito o fruto da aroeira-mansa, amoras, folhas, brotos, flores de eucaliptos e insetos, entre estes os alados de cupim ("siriris") capturados em voo. Vive normalmente na copa das árvores em busca dos frutos maduros, mas é intrépido o suficiente para apanhar também os caídos, preferindo até os que já estejam infestados de larvas e desfrutando-os com outras aves, como a saíra-amarela e o sabiá-da-praia.

### Reprodução:

O ninho, construído pelo casal, é compacto, feito de pequenas raízes, musgos e pecíolos foliares, com um diâmetro externo de cerca de 11 centímetros. Fica escondido na vegetação densa, numa forquilha de árvore, em alturas variáveis.

## Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Thraupidae 1847  
**Espécie:** *T. sayaca*



Extinta

Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# SOCÓ-BOI

## Tigrisoma lineatum



### Características:

Mede entre 66 e 76 centímetros de comprimento e pesa cerca de 840 gramas (Martínez-Vilalta, et al, 2016 em HBW). A plumagem adulta é idêntica para ambos os sexos e é adquirida aos dois anos de idade, caracterizando-se pelo pescoço castanho com uma faixa branca vertical na frente e manto pardo-acinzentado, manchado de acanelado; possui um bico bastante longo.

### Alimentação:

Alimenta-se de quase tudo que encontra: crustáceos, répteis, anfíbios, peixes e insetos. Captura suas presas andando vagorosamente, em águas rasas ou pântanos no interior da floresta. Oculto na densa vegetação, espreita peixes e outros organismos aquáticos ficando em total imobilidade nas margens. Captura sua presa com seu bico afilado, dardejando-a em golpes certos e retendo-a entre a maxila e a mandíbula.

### Reprodução:

Durante a época de reprodução o adulto emite uma forte voz, que lembra o esturro da onça pintada ou o mugir de um boi. Nidifica no alto de árvores e arbustos, sendo o ninho constituído de uma grande plataforma de gravetos. Põe geralmente 2 a 3 ovos que são levemente manchados, com um período de incubação de 31 a 34 dias. Os adultos costumam coletar o alimento da prole a grande distância do ninhal.

## Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Pelecaniformes  
**Família:** Ardeidae  
**Espécie:** T. lineatum



Extinta


Pouco preocupante

## Distribuição geográfica:



# SOCÓ-DORMINHOCO

## Nycticorax nycticorax



### Características:

Apresenta o alto da cabeça e o dorso negros, asas cinzentas, olhos grandes e vermelhos, e duas ou três penas nucais brancas. O imaturo, que apresenta uma coloração marrom-clara malhada com tons mais escuros, pode ser confundido com o imaturo de socó-boi (*Tigrisoma lineatum*).

### Alimentação:


Alimenta-se de peixes, anfíbios, crustáceos, insetos, pequenos répteis, pequenos mamíferos e filhotes de outras aves. Pesca às vezes sobrevoando águas profundas.

### Reprodução:

A época reprodutiva é entre setembro e janeiro. Ambos os sexos participam da construção do ninho, da incubação de até cinco ovos assincrônicos, de cor esverdeada ou verde-azulada, entre 21 a 24 dias, com os filhotes permanecendo entre 30 a 50 dias no ninho. Reproduz-se em colônias, em ninhos construídos entre 1 e 7 metros de altura.

### Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Pelecaniformes  
**Família:** Ardeidae 1820  
**Espécie:** *N. nycticorax*



Extinta


Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:



# SOCOZINHO

## Butorides striata



### Características:

Tem cerca de 36 centímetros. É inconfundível, devido às suas pernas curtas e amarelas e pelo seu andar agachado. Pode exibir um eriçado topete azulado quando agitado.

### Alimentação:

Alimenta-se de peixes, insetos aquáticos (imagos e larvas), caranguejos, moluscos, anfíbios e répteis. Permanece imóvel por longos períodos, empoleirado sobre a água ou em suas proximidades, à espera de presas.

### Reprodução:

Vive solitário o ano inteiro. No período reprodutivo, costuma fazer seu ninho separado das demais aves da família ou mesmota espécie, sendo raro encontrar colônias desse socó. Constrói seu ninho sobre árvores ou arbustos nos brejais. Os ovos são esverdeados ou verde-azulados (às vezes brancos ou esbranquiçados), uniformes. Põe 3 ou 4 ovos por ninhada. O período de incubação é de 21 a 23 dias.

### Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Pelecaniformes  
**Família:** Ardeidae Leach, 1820  
**Espécie:** B. striata



Extinta

Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:



# SUIRIRI-CAVALEIRO

## Machetornis rixosa



### Características:

O peito é amarelo, a garganta clara, a cabeça cinza e as partes superiores marrons, a íris é vermelha. Essa coloração lembra a de muitas outras espécies da família Tyrannidae. Mede cerca de 18 centímetros. As patas são compridas, o que ajuda a identificá-lo.

### Alimentação:


Como o próprio nome diz, o comportamento mais conhecido do suiriri-cavaleiro é o seu hábito de seguir bois, antas, capivaras e outros mamíferos grandes para capturar carrapatos e outros parasitas sobre estes animais ou para apanhar os insetos espantados por eles enquanto caminham.

### Reprodução:

Constrói um ninho de gravetos a cerca de 4 m do solo, mas eventualmente pode ocupar o ninho abandonado do João-de-Barro (*Furnarius rufus*). Os ovos, brancos ou cor de creme, são incubados pelo casal.

### Classificação Científica


**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Passeriformes  
**Família:** Tyrannidae  
**Espécie:** M. rixosa



Extinta


Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:



# URUBU-PRETO

## Coragyps atratus



### Características:

Dentre os urubus, é o de menor envergadura. Apesar de seu tamanho, é o mais agressivo dos urubus menores, disputando avidamente uma carcaça com as outras espécies. Não possui o olfato apurado do gênero Cathartes, localizando a carniçapela visão direta ou observando os outros urubus pousando para comer. Costuma deslocar-se a grande altura, usando as correntes de ar quente para diminuir o custo energético do voo.

### Alimentação:

Saprófaga, alimenta-se de carcaças de animais mortos e outros materiais orgânicos em decomposição, bem como de animais vivos impedidos de fugir, como filhotes de tartarugas e de outras aves.

### Reprodução:

Faz ninho em ocos de árvores mortas, entre pedras e outros locais abrigados, geralmente com incidência de árvores. Põe 2 ovos branco-azulados manchados com muitos pontos marrons.

### Classificação Científica

**Reino:** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Classe:** Aves  
**Ordem:** Cathartiformes  
**Família:** Threskiornithidae  
**Espécie:** C. atratus



Extinta

Pouco preocupante

### Distribuição geográfica:

